



Réseau de
Périnatalité
Occitanie

Le Nalador® se trouve dans ce réfrigérateur

OUTIL D'AIDE À L'UTILISATION DANS L'HÉMORRAGIE
DU POST-PARTUM PAR ATONIE UTÉRINE

► ARRÊT DE L'OCYTOCINE

- Évaluation de l'état cardiologique (ECG proposé, mais sans retarder la mise en place du produit)

TOUJOURS UNE PERFUSION IV STRICTE AU PSE



• 1^{ère} ampoule de 500 µg.

Complétée par sérum physiologique pour une seringue de 50 ml

- Passer 1^{ère} ampoule / 1heure soit 50 ml/heure

(Ou Paliers possible ↑ 10ml/h ttes les 5 min)

Accord de l'obstétricien et de l'anesthésiste à chaque nouvelle ampoule



• 2^{ème} ampoule : PSE de 10 ml/h soit une ampoule sur 5h



• 3^{ème} ampoule : non systématique, PSE de 4 ml/h soit cette dernière ampoule sur 12h

Poursuivre le monitoring cardiovasculaire 2h après l'arrêt de la sulprostone



DÉTECTER LES EFFETS INDÉSIRABLES DE FAÇON PRÉCOCE

- Evoquer le spasme coronarien en cas de douleur thoracique, troubles du rythme, hypotension importante, perte de connaissance ou collapsus cardiovasculaire (dosage de la Troponine à discuter)
- Hyperthermie, frissons, troubles digestifs fréquents et ne justifient pas d'explorations complémentaires

► RÉÉVALUATION PERMANENTE BÉNÉFICE / RISQUE

• **Contre indication absolue : asthme aigu, coronopathie**

- Précautions d'usage en cas d'insuffisance rénale